



スポーツ活動中の
熱中症予防
ガイドブック

スポーツ活動中の 熱中症予防5ヶ条

1

暑いとき、無理な運動は事故のもと

2

急な暑さに要注意

3

失われる水と塩分を取り戻そう

4

冷やそう、からだの外から内から

5

体調不良は事故のもと

目次

はじめに	2
PART 1 熱中症の病型と救急処置	4
■ 病型	4
PICK UP 熱疲労と熱射病	6
CHECK 熱中症になってしまったら	7
■ 救急処置	8
■ 熱射病が疑われる場合の身体冷却法	9
PART 2 スポーツ活動中の熱中症予防5ヶ条	10
PART 3 熱中症予防のための運動指針	15
■ 温度環境の評価	16
PART 4 解説	18
■ 暑いとき、無理な運動は事故のもと	18
体温調節の基礎知識	18
PICK UP 子どもの体温調節	23
熱中症発生実態と環境温度	24
PICK UP 典型的症例	32
■ 急な暑さに要注意	34
暑さへの慣れと熱中症	34
体を暑さに慣らすには	36
■ 失われる水と塩分を取り戻そう	37
運動と汗	37
運動時の水分補給のしかた	40
PICK UP 子どもの水分補給	42
PICK UP 低ナトリウム血症・水中毒	43
■ 冷やそう、からだの外から内から	44
身体冷却	44
衣服と体温	51
■ 体調不良は事故のもと	53
体調と熱中症	53
PICK UP 体調チェック	54
市民マラソンのための運動指針	56
プールにおける熱中症の予防	57
(公財)日本サッカー協会(JFA)のWBGTに基づいた熱中症対策	58
屋根付き運動スペース設置の提案	59
運動時の休憩の取り方	60
参考文献	62

はじめに

熱中症とは暑熱環境で発生する障害の総称で、重症になると死亡事故につながります。最近是一般にも熱中症という言葉が浸透していますが、地球温暖化、都市化によるヒートアイランド現象などから暑い夏が多くなり、屋外の労働現場での熱中症や日常生活での高齢者の熱中症死亡事故が増加し、社会問題として大きくクローズアップされています。今後、地球温暖化、人口の高齢化の進行とともに熱中症の問題はさらに大きくなるものと思われます。

スポーツによる熱中症死亡事故は無知と無理によって健康な人に生じるものであり、適切な予防措置さえ講ずれば防げるものです。ひとたび事故が起きると人命が失われるだけでなく、指導者はその責任を問われ訴訟になる例もあります。また、死亡事故に至らなくても熱中症になると、その後しばらくスポーツ活動を休まざるを得なくなり、トレーニングの面からもマイナスになります。そもそも暑熱環境下で無理にトレーニングをしても、トレーニングの質が低下するうえに消耗が激しく、トレーニング効果もあがりにくくなります。このような意味から、こまめに休憩をとり、水分補給をするなど適切な熱中症対策を講じ、よい状態でトレーニングすることは、熱中症を予防するだけでなく、トレーニングの質を確保し、効果的なトレーニングを進めることにも通じます。

熱中症の予防原則はすでに確立されたものですが、スポーツにおける熱中症を予防するためには、熱中症予防の原則を具体的にどのようにスポーツ活動に適用すればよいかが、問題になります。すでに諸外国においては、こうしたスポーツ活動における具体的な予防指針がいくつか発表されていましたが、残念ながらわが国では責任ある団体によってこのような指針が示されたことはありませんでした。

このような背景から、1991年日本体育協会(当時)に「スポーツ活動における熱

中症事故予防に関する研究班」が設置されました。この研究班では、スポーツ活動による熱中症事故の実態調査、スポーツ現場での測定、運動時の体温調節に関する基礎的研究など幅広く研究を行いました。こうした研究成果をもとに1994年には熱中症予防の原則を「熱中症予防8ヶ条」(その後、熱中症予防5ヶ条に改訂)としてまとめ、具体的なガイドラインとして「熱中症予防のための運動指針」を発表しました。

本ガイドブックは、これらの研究成果を取り入れて熱中症とその予防について解説したもので、1994年に初版を発刊しました。日本スポーツ協会ではこのガイドブックを広く関係者に配布するとともに全国で熱中症予防のセミナーを開催してきました。本ガイドブックは初版以降、データを更新したり、最新の情報を取り入れるなど、改訂してきました。最近ではスポーツ活動中の身体冷却が注目されるようになり、その有効性が認められるようになりました。しかし、スポーツの現場へ十分には普及されていません。そこで今回の改訂では、データを更新するとともに、身体冷却を大きく取り上げることにし、スポーツ活動中の熱中症予防5ヶ条へ入れることにしました。

スポーツによる熱中症は増えていますが、幸い死亡事故は減少しています。これは、日本スポーツ協会による熱中症予防の取り組みが実を結んできているのではないかと考えられます。夏の暑さが続く限り、熱中症を完全に予防することは難しいかも知れませんが、重症例や死亡事故は防がなくてはなりません。今後とも、スポーツによる熱中症事故がなくなるよう、われわれはさらに熱中症予防の呼びかけを続けていかなければならないと考えています。この冊子が熱中症死亡事故ゼロに貢献できれば幸いです。

令和7年6月 スポーツ活動における熱中症事故予防に関する研究班 班長 川原 貴

熱中症の病型と 救急処置

熱中症とは、暑さによって生じる障害の総称で、熱失神、熱けいれん、熱疲労、熱射病などの病型があります。運動をすると大量の熱が発生します。一方で、皮膚血管の拡張と発汗によって体表面から熱を放散し、体温のバランスを保とうとしますが、暑いと熱放散の効率は悪くなります。このような状況で生理機能の調節や体温調節が破綻して熱中症は起こります。暑いときのスポーツ活動では熱中症が起こりやすいので、熱中症の兆候に注意し、適切に対処する必要があります。スポーツで主に問題となるのは熱疲労と熱射病です。最重症型である熱射病では死亡率が高いため、熱射病が疑われる場合には一刻を争って身体冷却をしなければなりません。



病型



1 >>> 熱失神

炎天下にじっと立っていたり、立ち上がったとき、運動後などに起こります。皮膚血管の拡張と下肢への血液貯留のために血圧が低下、脳血流が減少して起こるもので、めまいや失神（一過性の意識消失）などの症状がみられます。足を高くして寝かせると通常はすぐに回復します。

2 >>> 熱けいれん

汗には塩分も含まれています。大量に汗をかき、水だけ（あるいは塩分の少ない水）を補給して血液中の塩分濃度が低下したときに起こるもので、痛みをともなう筋けいれん（こむら返りのような状態）がみられます。下肢の筋だけでなく上

肢や腹筋などにも起こります。生理食塩水(0.9%食塩水)など濃い目の食塩水の補給や点滴により通常は回復します。

3 >>> 熱疲労

発汗による脱水と皮膚血管の拡張による循環不全の状態であり、脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などの症状がみられます。スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給することにより通常は回復します。嘔吐などにより水が飲めない場合には、点滴などの医療処置が必要です。

4 >>> 熱射病

過度に体温が上昇(40℃以上)して脳機能に異常をきたした状態です。体温調節も働かなくなります。種々の程度の意識障害がみられ、応答が鈍い、言動がおかしいといった状態から進行すると昏睡状態になります。高体温が持続すると脳だけでなく、肝臓、腎臓、肺、心臓などの多臓器障害を併発し、死亡率が高くなります。死の危険のある緊急事態であり、救命できるかどうかは、いかに早く体温を下げられるかにかかっています。救急車を要請し、速やかに冷却処置を開始します。





熱疲労と熱射病

熱疲労は、熱中症のなかでも一般によくみられる病型です。一方、熱射病は死の危険性が高い緊急事態で、熱疲労とは区別しなければなりません。判断に迷うような場合には、必ず熱射病として対処します。

暑熱環境で長時間の運動をすると、大量に発汗するため、水分と塩分を失い、循環血液量が減少し、重要臓器への血流が不足します。過度の脱水とそのための循環不全が熱疲労の病態です。熱疲労の症状は、「頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、脱力感、倦怠感など」がみられます。体温は正常もしくは軽度上昇するものの、40℃を超えることはありません。また、通常は意識障害もなく、治療により回復し、命にかかわることはありません。熱疲労の症状に気づき、ペースを落とす、もっとドリンクを飲む、身体を冷やすなどの対処をし、熱射病への進展を防いでください。


熱疲労と思われても、そのまま無理に運動を続け病態がさらに進行すると、脱水と血清浸透圧上昇のために、皮膚血管拡張や発汗が抑制されます。その結果、熱放散量が減少し、体温がさらに上昇する悪循環に陥り、40℃以上の高体温(脳のオーバーヒート)に至ります。そのため、脳機能の障害に伴い、意識障害や体温調節機能不全(発汗停止)をきたしたものが熱射病です。ただし、運動時の熱射病では、発汗が続いていることもあります。なお、熱疲労の病態を経ずに、短時間(1時間以内)に体温が過度に上昇し、熱射病に至ることもあります。重症の昏睡だけでなく、応答が鈍い、何となく言動がおかしい、日時や場所がわからないなどの軽いものも意識障害と評価し、熱射病として対処してください。

いずれにしても、いったん熱射病を発症すると、迅速適切な救急救命処置を行っても救命できないことがあるため、熱疲労から熱射病への進展を予防することが重要です。言い換えれば、熱疲労は無理な運動を避けるための防御反応とみなすこともできます。熱疲労の段階で運動を中止すれば、生死にかかわる重篤な熱射病になる危険性を回避できるからです。その意味で、暑熱下のスポーツ活動において、スポーツ指導者は常に選手の発する安全装置のサインに目を配る必要があります。



＼ CHECK /

熱中症になってしまったら





救急処置



熱中症を4つの病型に分けて、病態と対処法を説明しましたが、実際の例ではこれらの病型に明確に分かれているわけではなく、脱水、塩分の不足、循環不全、体温上昇などがさまざまな程度に組み合わさっていると考えられます。したがって、救急処置は病型によって判断するより重症度に応じて対処するのがよいでしょう。

暑い時期の運動中に熱中症が疑われるような症状がみられた場合、まず、重症な病型である熱射病かどうかを判断する必要があります。熱射病の特徴は高体温（直腸温40℃以上）と意識障害であり、応答が鈍い、言動がおかしいなど少しでも意識障害がみられる場合には熱射病を疑い、救急車を要請し、涼しいところに運び、速やかに身体冷却を行います。

意識が正常な場合には涼しい場所に移し、衣服をゆるめて寝かせ、スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給します。また、うちわなどで扇ぐのもよいでしょう。吐き気などで水分が補給できない場合には、医療機関での点滴などの治療が必要です。


大量に汗をかいたにもかかわらず、水だけしか補給していない状況で、熱けいれんが疑われる場合には、スポーツドリンクに塩を足したものや、生理食塩水（0.9%食塩水）など濃い目の食塩水で水分と塩分を補給します。

このような処置をしても症状が改善しない場合には、医療機関を受診します。現場での処置によって症状が改善した場合でも、当日のスポーツ参加は中止し、少なくとも翌日までは経過観察が必要です。

◆ 熱射病が疑われる場合の身体冷却法

現場での身体冷却法としては氷水に全身を浸して冷却する方法「氷水浴／冷水浴法」が最も効果的とされています。マラソンレースの救護所などでバスタブが準備でき、医療スタッフが対応可能な場合には、冷(氷)水浴法が推奨されます。学校や一般のスポーツ現場では、水道につないだホースで全身に水をかけ続ける「水道水散布法」が、次に推奨されます。それも困難な場合や学校現場などでは、エアコンのよく利いた保健室に収容し、氷水の洗面器やバケツで濡らしたタオルをたくさん用意し、全身にのせて、次々に取り換えてください。扇風機も併用します。また、氷やアイスパックなどを頸、腋の下、脚の付け根など太い血管に当てて追加的に冷やすのもよいでしょう。

現場での体温測定としては、「直腸温」が唯一信頼できる測定です。熱射病の診断($>40^{\circ}\text{C}$)にも、身体冷却中のモニタリングにも有用であり、直腸温が約 39°C となるまで冷却します。ただし、直腸温の測定ができない場合でも、熱射病が疑われる場合には身体冷却を躊躇すべきではなく、その場合には「寒い」というまで冷却します。運動時の熱射病の救命は、いかに速く(約30分以内に)体温を 40°C 以下に下げることができるかにかかります。現場で可能な方法を組み合わせて冷却を開始し、救急隊の到着を待ってください。



スポーツ活動中の 熱中症予防5ヶ条

1

暑いとき、無理な運動は事故のもと


気温が高いときほど、また同じ気温でも湿度が高いときほど、熱中症の危険性は高くなります。また、運動強度が高いほど熱の産生が多くなり、やはり熱中症の危険性も高くなります。暑いときに無理な運動をしても効果はあがりません。環境条件に応じて運動強度を調節し、適宜休憩をとり、適切な水分補給を心掛けましょう。(15ページの「熱中症予防運動指針」を参照)





急な暑さに要注意

熱中症事故は、急に暑くなったときに多く発生しています。夏の初めや合宿の初日、あるいは夏以外でも急に気温が高くなったような場合に熱中症が起こりやすくなります。急に暑くなったら、軽い運動にとどめ、暑さに慣れるまでの数日間は軽い短時間の運動から徐々に運動強度や運動量を増やしていくようにしましょう。






失われる水と塩分を取り戻そう

暑いときには、こまめに水分を補給しましょう。汗からは水分と同時に塩分も失われます。スポーツドリンクなどを利用して、0.1～0.2%程度の塩分も補給するとよいでしょう。


水分補給量の目安として、運動による体重減少が2%を超えないように補給します。運動前後に体重を測ることで、失われた水分量を知ることができます。運動の前後に、また毎朝起床時に体重を測る習慣を身につけ、体調管理に役立てることが勧められます。





冷やそう、からだの外から内から


適度な体温の上昇は運動能力を高めますが、暑さの厳しい中での運動では体温が大きく上昇し、運動能力の低下や熱中症を引き起こしてしまいます。身体冷却を用いることで暑さの中でも体温の過度な上昇を抑えることができ、運動能力や認知機能の低下、多量の汗による脱水を防ぐことができます。また熱を逃がしやすくするため、できるだけ薄着にしましょう。防具をつけるスポーツでは休憩中ははずして、できるだけ熱を下げるようにしましょう。





体調不良は事故のもと

体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。疲労、睡眠不足、発熱、風邪、下痢など、体調の悪いときには無理に運動をしないことです。また、体力の低い人、肥満の人、暑さに慣れていない人、熱中症を起こしたことがある人などは暑さに弱いので注意が必要です。学校で起きた熱中症死亡事故の7割は肥満の人に起きており、肥満の人は特に注意しなければなりません。



熱中症予防のための 運動指針

この指針は、熱中症予防5ヶ条のポイントを理解したうえで、環境温度に応じてどのように運動したらよいかの目安を示したものです。環境温度の基準は湿球黒球温度(WBGT)に基づきました(16ページ参照)。しかし、現場ではWBGTが測定できない場合もあり、WBGTにおよそ対応する湿球温度、乾球温度も示してあります。実状に合わせて使用してください。

熱中症予防運動指針

WBGT ℃	湿球温度 ℃	乾球温度 ℃		
31	27	35	運動は原則中止	特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合には中止すべき。
◆	◆	◆	嚴重警戒 (激しい運動は中止)	熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。10~20分おきに休憩をとり水分・塩分を補給する。暑さに弱い人※は運動を軽減または中止。
28	24	31	警戒 (積極的に休憩)	熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。
25	21	28	注意 (積極的に水分補給)	熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。
21	18	24	ほぼ安全 (適宜水分補給)	通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。

1) 環境条件の評価にはWBGT(暑さ指数とも言われる)の使用が望ましい。

2) 乾球温度(気温)を用いる場合には、湿度に注意する。湿度が高ければ、1ランク厳しい環境条件の運動指針を適用する。

3) 熱中症の発症のリスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。運動指針は平均的な目安であり、スポーツ現場では個人差や競技特性に配慮する。

※暑さに弱い人: 体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など。

温度環境の評価



暑さの指標

熱中症予防の温度指標として、WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature : 湿球黒球温度) が用いられます。最近では、暑さ指数とも言われています。暑さ寒さに関する環境因子として気温、湿度、輻射熱、気流の4つがあります。WBGTは湿球温度、黒球温度(輻射熱)と乾球温度(気温)の3項目から算出されますが、湿球温度と黒球温度には気流の影響も反映されるので、WBGTは4因子すべてを反映した指標と言えます。

WBGTの測定

WBGTは図1に示した乾湿温度計と黒球温度計(直径15センチの銅球)から、乾球温度、湿球温度、黒球温度を測定し、以下の式で算出します。

屋外で日射のある場合

$$WBGT = 0.7 \times \text{湿球温度} + 0.2 \times \text{黒球温度} + 0.1 \times \text{乾球温度}$$

室内で日射のない場合

$$WBGT = 0.7 \times \text{湿球温度} + 0.3 \times \text{黒球温度}$$




図1 August乾湿温度計と黒球温度計




図2 WBGT測定装置
(リアルタイムでWBGTと周囲温度が表示される)

乾球温度と湿球温度は、輻射熱(日射)の影響を防ぎ、自然気流の状態で測定します(図1右のように乾球温度計は日陰で用いる)。WBGTをリアルタイムで表示できる装置も普及しています(図2)。

▶ WBGT測定器 小型／携帯型の紹介

市販の小型、携帯型のWBGT計の多くは湿球温度の代わりに半導体型の湿度センサーを用いて相対湿度を測定し、演算で湿球温度を算出し、リアルタイムでWBGTを表示します。黒球についても規定の直径15cmの銅球ではなく、小型の亚克力製の黒球を用いているものがほとんどです。これらの電子式WBGT計を対象に平成29年にJIS規格が設けられ、誤差の限界(想定される最大の誤差)が「クラス」として規定されました(クラス1:±1℃、クラス1.5:±1.5℃、クラス2:±2℃)。黒球のない簡易型は、WBGTの構成要素である黒球温度を評価できないため、正確さの点で問題があり、特に屋外での使用は推奨できません。



【参考】WBGT指標による暑熱環境評価と、電子式WBGT測定器のJIS化について
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2017/102-column-1.html



解 説


暑いとき、無理な運動は事故のもと

体温調節の基礎知識

体温

身体の温度は部位によって異なり、身体内部(核心部)の温度は高く、表面(外殻部)は低くなっています(図3)。一般に体温と呼んだ場合は、核心部の温度を指します。通常、体温として舌下温や腋下温を測りますが、より正確な体温を測るには食道温や直腸温を用います。一方、温度の変化しやすい外殻部の温度としては皮膚温を測ります。

体温が異常に上昇したり低下したりして体温調節機能が著しく障害を受けると、循環器系や中枢神経系に機能不全が起これ、生命を脅かすことにもなります。したがって、ヒトなど哺乳動物がいとなく体温調節の目的は、核心部の体温を一定の範囲に保つことなのです。



体温調節のしくみ

人の体温は、脳に組み込まれたサーモスタットの働きによって、ほぼ37℃になるように調節されています。これは、代謝によって発生する熱と体から逃げていく熱とがうまくバランスをとっているからです(図4)。

おもな熱産生として、基礎代謝、身体活動に伴う熱産生、ホルモンの影響などがあげられます。安静時の熱は、肝臓、脳、腎臓などの内臓で発生しますが、スポーツ活動時には筋で大量の熱が発生するため、体温が上昇します。

一方、身体各部位の熱は血液の循環によって体表に運ばれ、輻射、伝導、対流などによって体外に放散されます。さらに全身の皮膚に分布する汗腺から汗が分泌され、汗の蒸発による熱放散も起こります。熱産生と熱放散のバランスが崩れ熱産生量が熱放散量を上回った場合には、熱が体に蓄積され体温が上昇、逆の場合には体温が低下します。



図4 熱産生と熱放散のバランス

▶ 運動時の体温上昇

身体運動を行うと、筋収縮に伴う熱産生量は安静時の10～15倍にも増え、体温が上昇します。筋のエネルギー効率を約20%と考えると、運動に伴う代謝エネルギーの約80%が熱に変換されることとなります。体重60kgの人が中程度の運動をした場合、全く熱放散できなければ、体温は30分後には40℃にまで達してしまい、運動を続けられなくなります。しかし実際には、30分間でせいぜい1℃程度の体温上昇にとどまります。皮膚血流の増加や汗の蒸発など強力な体温調節の働きによって多量の熱を放散できるからです。

図5は屋外でランニングを行っているときの体温調節の様相を表したものです。熱放散経路は大きく2つに分けられ、皮膚表面から輻射、伝導、対流によって放熱される非蒸発性熱放散と、皮膚表面から汗が蒸発することによる蒸発性熱放散とがあります。

非蒸発性熱放散は、皮膚と周りの空気との温度差が大きいほど皮膚表面から空気へ捨てる熱量が大きくなり、反対に空気の温度が皮膚の温度より高いとき（外気温がおよそ35℃を超えるときや輻射熱の多いとき）には、熱が体に流れ込み体温が上昇します。

一方、汗は皮膚表面から蒸発するとき、気化熱を奪って体温を低下させます（蒸発性熱放散）。汗の蒸発による熱放散は気温が高くても影響は受けませんが、湿度が高いと汗の蒸発が制限され、熱放散の効率が低下します。




図 5 運動時の環境ストレスと熱放散経路

- 熱産生量 = 熱放散量 ± 蓄熱量
- 熱放散量 = 蒸発性熱放散量 ± 非蒸発性熱放散量
- 熱の収支に関係する環境因子は、気温、湿度、輻射熱、気流である。
WBGTは、乾球温度(気温)、湿球温度(湿度)、黒球温度(輻射熱)から計算するが、
湿球温度と黒球温度には気流の影響も含まれるため、WBGTは4要因すべてを反映する。

▶ 運動の強度と体温

熱産生量は運動強度に比例して大きくなり、体温も運動強度に比例して上昇します。しかし、熱放散のための機構（蒸発性および非蒸発性熱放散機構）がうまく働いている限り、体温は一定の範囲内に維持され、生命に危険なほどには上昇しません。熱放散は気温、湿度、風の強さ、および輻射熱の影響を受けますが、特に気温や湿度、輻射熱が高い環境下で強い運動を行えば、熱産生量に見合った熱放散ができず、体温が過度に上昇します。したがって環境温度が高いときには、まずは運動強度を下げなければなりません。

運動すると、体は血液配分をめぐる2つの問題を抱えることとなります。すなわち、運動を続けるための筋肉組織への血液確保と、熱放散のための皮膚への血液確保です。つまり、運動のための筋血流と体温調節のための皮膚血流との間で血液の奪い合いが起こるのです。しかし、皮膚への血液が増加すると、多くの血液が皮膚にたまってしまい、心臓へ戻る血液の量が減少することになります。そこで、内臓の血管を収縮させて内臓への血液を減らし、なんとか心臓への血液の戻りが減少しないように調節しているのです。

ところが、運動強度が強すぎたり環境温度が高すぎたりすると、この調節がうまくできなくなります。その結果、循環器系や中枢神経系の機能不全が起こり、生命を脅かすことさえあります。環境条件を考慮して運動の強さを設定することが大切なのは、このためです。「熱中症予防運動指針」(15ページ)には環境温度に応じた運動強度の設定のしかたが具体的に示されていますので、このことを十分に理解してください。



子どもの体温調節

熱放散量は身体サイズに影響されます。立方体の物理特性として、体積(サイズ)が小さくなるにつれ表面積は相対的に大きくなっていきます。したがって、子どもの体表面積は体重比にすれば大人より広くなります。産熱量は体重に比例するので、子どもは熱産生量に比し相対的に広い放熱面積を持つことになります。つまり、子どもの体は物理的に熱しやすく冷めやすい特性を持っているのです。

一方、子どもの発汗機能は未発達で、大人より発汗量が少なく、その差は多くの汗を必要とする条件ほど顕著になります。子どもは発汗能力で劣る分、頭部や躯幹部の皮膚血流量を大人より増加させて熱放散を促進する特性を持っています。

子どもは汗っかきではない

環境温<皮膚温……深部体温＝
環境温>皮膚温……深部体温↑

体表面積/体重
子ども>成人



子どもの熱放散特性の模式図
(井上,2010)

ただし、子どもの広い体表面積が有利なのは、環境温が皮膚温より低く非蒸発性熱放散によって環境が体表の熱を奪ってくれる場合に限られます。環境温が皮膚温より高く、輻射熱の大きな条件(夏季の炎天下)になると、熱は逆に体に入ってくるようになり、子どもの広い体表面積はかえって不利になります。またこのような環境条件では汗が唯一の熱放散手段になるので、子どもの未発達な発汗機能が深部体温をさらに上昇させます。

子どもは決して「汗っかき」ではありません。真っ赤な顔をして汗っかきに見える場合でも、それは熱ストレスが大きくなっているからなのです。思春期前の子どものとって、WBGT 31℃以上、すなわち「熱中症予防運動指針」において「運動は原則中止」に相当する高温環境では、大人以上に過酷な熱ストレスになり、特に持久的運動には不向きです。したがって、子どものスポーツ活動では、環境条件が「運動は原則中止」になっていないかどうか特に注意する必要があります。

熱中症発生実態と環境温度

最近の熱中症死亡数

熱中症による死亡数は、1968～2023年の56年間で23,903件(男13,773件、女10,130件)年間平均では427件になります(図6)。なかでも、1994年以降は年次ごとに増加する傾向にあることが目を引きます。特に熱波であった2010年では、年間で1,745件もの死亡が発生し、2018年以降はほとんどの年で年間1,600件を超えています。




図6 熱中症死亡数の年次推移(男女別)
(中井,2019 厚生労働省,2025)

年齢層別にみると、15～19歳で小さな山がみられ、特に男性に多くみられますが、そのほとんどがスポーツ活動中の事故と考えられます。一方、30～59歳になると男性の事故数が年齢とともに増えていますが、こちらは主に労働時の発生と思われます。また、65歳以上からは女性の事故数が急増しています。ここでの原因は、日常生活、労働(家事などを含む)、スポーツ活動など多様な状況での発生と考えられます(次ページ図7)。

図8は、年齢層別の事故数をその年の総数に占める割合で年次ごとに示したものです。65歳以上の割合をみると、1994年以降増加しており、高齢者の熱中症死亡数が相対的に増加していることがわかります。一方、それ以下の年齢層ではむしろ低下傾向にあります。スポーツ活動中の熱中症予防活動に一定の成果があったものと思われる。ただし、死亡数は減少していても、熱中症で救急搬送された数は減少しておらず、引き続き予防活動を怠ってはならないでしょう。

また、高齢者の熱中症発生場所に注目してみると、自宅、屋外道路・駐車場が多く、睡眠中の発症が多いのも特徴的です。日常生活での高齢者のケアや家族の協力も重要になってくるでしょう。




図7 熱中症死亡数の年齢階級別累積分布(1968～2023年)
(中井,2019 厚生労働省,2025)




図8 熱中症総数に対する年齢階級別割合の年次推移
(中井,2019 厚生労働省,2025)

発生時の環境温度

つぎに、運動時の熱中症事故例で温度と湿度の資料が入りできた479例(死亡、非死亡例をともに含む)について、両者の関係を図9に示しました。気温が比較的低くても湿度が高ければ熱中症事故は発生しています。熱中症の発生には、気温だけでなく湿度も大きく影響していることがわかります。

なお、熱中症事故はそれほど気温が高なくても発生していることにも注意しておかなければなりません。気温16℃以下においても熱中症は4例発生し、最も低温の5.7℃で発生した事例は2月の校内マラソンで、厚着をして走った例でした。その他、野球練習時にダッシュを繰り返したりレスリングの減量時に発生しています。熱中症の発生には環境温度だけでなく、無理な運動が影響していたことが考えられます。




図9 運動時熱中症発生時の相対湿度と気温の関係 (1970～2018年)
(中井,2019)

このほか、気温と湿度だけでなく、とりわけ夏期の運動場ではグラウンドからの照り返しなど輻射熱の影響も重要になります。したがって、環境温度には気温、湿度、輻射熱、気流の4要素を組み入れたWBGT(暑さ指数)を用いることが勧められるのです。WBGTと熱中症事故発生件数との関係は図10に示したとおりです。WBGTが16℃以下でも事故は起きており、25℃前後から増え始め、28℃を超えると急激に増加しています。ただし31℃以上になると、事故数は少なくなります。このような過酷な条件になるとさすがに無理な運動が少なくなるからでしょう。

高温になるほど、熱中症の発生リスクが増加します。そこで、WBGTを基準にして運動のしかた、注意点を示したのが「熱中症予防運動指針」(15ページ)でした。図10にも、その運動指針のポイントを示しています。「運動指針」とあわせて参照してください。




図10 運動時熱中症発生時のWBGT分布とWBGT[暑さ指数、℃] (1970～2018年)
(中井,2019)

▶ 学校管理下の熱中症死亡事故

わが国のスポーツによる熱中症事故全体のデータはありませんが、学童・生徒の学校管理下の事故については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付のデータがあります。熱中症の医療費給付の件数は1980～90年代では年間300件程度でしたが、2000年頃から増加し、2010年代には年4000件を超えています(図11)。これらのうち約8割は体育的活動で発生しています。2020年、21年に急激に減少したのは、新型コロナウイルス感染拡大で、スポーツ活動が制限されたためと考えられます。制限が解除された23年も3000件台に留まっていますが、医療機関を受診しない軽症例を含めると、かなりの数の熱中症が発生しているものと推測されます。

学校管理下の熱中症死亡事故は1960～2023年の64年間に198件ありました。死亡事故は1975年頃から増加し、1984年をピークにその後はやや減少し、最近では明らかに減少しています(図12)。熱中症の医療費給付件数は増加しているにもかかわらず、死亡数が減少しているということは、熱中症に対する認識が高まり、早めに医療機関を受診させていることが考えられます。

図11 学校管理下の熱中症医療費給付件数の推移 (1983～2023年)





図12 学校管理下の熱中症死亡事故の推移 (1960～2023年 n=198)

そこで、熱中症事故が増加し始めた1975年以降、2023年までの49年間の死亡事例173件について分析してみました。173件のうち運動部活動によるものは146件、学校行事によるものが22件、その他5件であり、多くは運動部活動によるものでした。運動部活動による熱中症死亡事故146件のスポーツ種目では野球が最も多く、屋外種目ではラグビー、サッカー、屋内種目では柔道、剣道で多く発生しています(図13)。




図13 スポーツ部活動の種目
学校管理下の熱中症死亡事故
(1975～2023年 n=146)

スポーツ種目は多岐にわたっていますが、練習内容では持久走やダッシュの繰り返しなど継続するランニングで多発しています。学校行事も登山8件、マラソン4件、長距離徒歩3件、スポーツ大会3件などスポーツ活動が多く、学校管理下の熱中症死亡事故はほとんどがスポーツ活動によるものと言えます。

図14は性別、学年別の死亡事故数を示したものです。性別では男子159件、女子14件で圧倒的に男子に多くみられました。これは男子が暑さに弱いというより、激しい運動をするためと考えられます。スポーツ少年団の活動は学校管理下ではないため、小学生は6件と少なく、中学生42件、高校生122件、高専2件で71%が高校生でした。高校ではスポーツ活動が本格化してくるため、事故が多くなると考えられます。また、学年では体力や技術が未熟な低学年に多くみられました。




図14 性別・学年別件数 学校管理下の熱中症死亡事故(1975～2023年 n=173)

発生時期が分かっている170件のうち、7月と8月の発生が合わせて153件、88%を占めています。特に7月下旬～8月上旬に多く発生しています(図15)。このことは、梅雨明けで体が暑さに慣れていない時期に起きやすいため、と考えられます。2～5月にかけて4件、11月に1件発生していますが、これらは校内行事のマラソン、30km徒歩によるものでした。

発生時刻では午前10時～午後4時の間に多くみられますが、午前10時以前、午後6時以降にも発生しています(図16)。




図15 発生時期 学校管理下の熱中症死亡事故 (1975～2017年 n=170)




図16 発生時刻 学校管理下の熱中症死亡事故 (1975～2017年 n=170)

173件のうち運動によるもので、その開始時間の記載があった146件について、熱中症発生までの運動時間をみると、必ずしも長時間とは限らず、2時間以内が38%、そのうち1時間以内が14%みられました(図17)。激しい運動では短時間でも死亡事故が起こりうることに注意が必要です。1時間以内に発生した例の多くは持久走によるものであり、暑いときの慣れない持久走は避けるべきです。




図17 運動開始から発症までの時間 学校管理下の熱中症死亡事故 (1975～2017年 n=146)

熱中症発生から死亡までの時間が分かっている168例をみると、6時間以内が24%、24時間以内が62%と急速に病状が悪化して死亡に至る例が多くみられます(図18)。このことは、重症熱中症の救命には、いかに早く体温を下げられるかが重要であることを示していると思われます。

事故例での体力や体調など個人の要因については、資料だけでは不明な点が多いのですが、1990～2017年の事故例のうち身長、体重の記載があった45例の体格的特徴をみみると、標準体重から20%以上超過している肥満者は69%にのぼり、熱中症死亡事故に肥満者が多いことがわかります(図19)。肥満の人は熱中症を起こしやすく、30分のランニングで死亡した例もあり、特別の配慮が必要です。




図18 発症から死亡までの時間
学校管理下の熱中症死亡事故
(1975～2017年 n=168)




図19 肥満度 (%)
学校管理下の熱中症死亡事故
(1990～2017年 n=45)

典型的症例

運動時の熱中症の典型的症例を示します。各病型の発生機序や症状の違いを理解し、予防につなげましょう。

症例1 × 熱けいれん

23歳、男性。7月末、炎天下で約1時間テニスの練習をし、たくさん汗をかいた。練習後に多量のジュースや氷水を飲んだところ、間もなく強い腹痛が起こり、自ら近医を受診した。急性腹症※1の診断を受け、救急施設へ救急車にて搬送された。救急施設到着時には、意識は清明で、血圧、脈拍、呼吸などはすべてほぼ正常であった。腹部は腹筋全体の強い強直が認められたが、グル音※2は聴取でき、腹部単純X線像には異常を認めなかった。直ちに500ccの生理的食塩水の急速点滴を行ったところ、腹筋の強直は急速に消失した。熱けいれんは下肢に生じることが一般的であるが、このように腹筋に生じることもある。ほぼ典型的な熱けいれんの症例である。

※1:開腹手術を要する可能性のある腹痛。 ※2:腸管が動く音

症例2 × 熱疲労

45歳、男性。夏の炎天下、ゴルフを行った。ワンラウンドを終わる頃から、次第に酷暑が耐え難くなり、全身倦怠感と頭痛が強くなり吐き気を伴うようになった。プレーが終り、冷たいシャワーを浴びたが頭痛は続き、吐き気のため飲料もあまり飲むことができなかった。帰宅するため、クーラーの効いた自動車に乗ったところ、ますます気分は悪くなり嘔吐を繰り返すようになったため、途中で病院を受診した。受診時、発汗が続いており、皮膚はむしろ冷たいくらいであった。血圧、脈拍、呼吸は正常であるが、頭痛とめまいを訴えていた。直腸温は36.5℃であった。強い頭痛、吐き気、嘔吐、めまいなどは中枢神経系の循環不全に由来する症状である。



症例3 × 熱射病(救命例)

45歳、男性。炎天下のマラソン中に倒れ、救急搬送された。意識は昏迷し※1、うわ言を言い、不穏な動きをしていた。来院後間もなく、全身けいれんを起し、昏睡状態となった。体温は41℃で、皮膚は熱く乾燥※2。血圧は正常で、軽度の頻脈があった。氷水中での全身冷却※3を行いつつ、鎮静剤の投与と持続点滴を行った。呼吸管理に困難をきたしたため、気管内挿管を行い人工呼吸器に接続した。約2時間後に直腸温は38℃まで下降したので、ICUに移し、体液・呼吸などの管理を行った。間もなく利尿剤により利尿が得られるようになった。12時間後に意識が回復し、人工呼吸器を止め、自発呼吸に復した。以後、順調に回復した。

※1:意識障害のレベルの一つで、昏睡よりは軽い。

※2:これは、発汗停止を意味するが、運動時の熱射病では発汗が続いていることもあり、注意を要する。

※3:氷水浴/冷水浴法は、末梢血管収縮やシバリングを誘発するため体温が低下しないとの危惧から、かつては禁忌とされてきたが、最近では、その大きな体温低下率から、熱射病の身体冷却法の第一選択法として推奨されるに至った。

症例4 × 熱射病(死亡例)

17歳、男性。35℃の炎天下に、アメリカンフットボールの練習後に、練習態度不良の理由で、プロテクター、ヘルメットなど完全装備の上、駆け足を命じられた。一緒に走った仲間達は次々と落伍していったが、この生徒はキャプテンであり責任感を感じたのか一人で走り続け、グラウンドを数周後に崩れるように倒れた。近医に救急搬送されたが、昏睡状態で、全身は強直性にけいれんしていた。体温は42℃以上で測定不能。2時間の全身冷却にもかかわらず、体温はなお40℃であり、全身状態の改善がないため当科へ転送入院。来院時、強直性けいれんを伴う深昏睡、ショック状態(血圧70/0mmHg、脈拍数140/分、四肢末梢冷)であった。血清浸透圧の上昇、ヘモグロビンの異常高値(18.7g/dl)から極度の脱水が示唆された。全身の氷水中での冷却、大量の輸液を行った。筋強直は筋弛緩剤の投与によって自発呼吸が停止しても、下半身では消失しなかった。血圧は30Lの大量の輸液・輸血と昇圧剤の投与によってようやく維持されたが、利尿剤を併用しないと尿量は全く得られなかった。20時間後から急速な肺機能の低下をきたすとともに、烈しい下血、吐血、肺出血をきたし、26時間で死亡した。

出典 1) 杉本 侃ほか:高温環境下の障害-いわゆる熱射病-.総合臨床,29,555-558,1980. 2) 松本孝朗:運動と熱中症.保健の科学,56(7),457-463,2014.

急な暑さに要注意

暑さへの慣れと熱中症

熱中症は、梅雨明けなどの気温が急に上昇したときに多く発生しています。また、学校の部活練習における合宿初日や休み明け、あるいは低学年(特に新入生)に多くみられます。いずれも、「体が暑さに慣れていない」からです。図20は、熱中症発生時の相対湿度と気温の関係を示した26ページの図9について、発生時期を6月と7月に区分した図です。6月の気温分布は7月に比して明らかに低温に分布し、その差は約4℃低値となります。暑さに慣れていない6月は熱中症が起きやすいことがよくわかります。




図20 運動時熱中症発生時の相対湿度と気温の月別分布(1970~2018年)
(中井,2019)

暑い環境下において運動トレーニングを繰り返し行くと、暑さへの抵抗力(耐性)が高くなります。このように体が暑さに慣れることを暑熱順化と言います。暑熱順化すると、暑熱環境における安静時および運動時の体温上昇や心拍数増加などの生理的ストレスを軽減することができます。また循環血液量が増加し、汗をかき始める時間も早くなります。そのため同一体温あたりの汗の量も増え、より効果的な体温調節ができるようになり、運動をより長く続けられ、また熱中症の危険性も少なくなるのです(図21)。




図 21 暑熱順化による主な体の変化
(Périardら, 2015)

≫≫ 体を暑さに慣らすには ≪≪

暑さに慣れるためにはどのようなことをしたらよいのでしょうか？

本格的な夏のトレーニングや競技会に備え、気温が高くなり始めたら、暑さに慣れるまでの順化期間を設けましょう。順化期間の最初は運動量を落とし、次第に負荷を高めて行きます。ただし現場では、環境条件や各個人の状態も異なるため、個々の選手の状態をよく把握して順化を進めていくことが大切です。また、普段の冷房使用に関しても、本格的な暑さの前(5～6月)に冷房に頼りすぎると暑さへの慣れを遅らせることにもなるので、注意したいところです。

熱中症予防を目的とした暑熱順化のためのポイント

1 開始時期

- ▶ 気温が高くなり始める5～6月から開始する。
- ▶ 暑熱環境地域に移動して競技会に参加する場合は、5日間以上前に現地に入るのが望ましい。

2 暑熱順化に必要な期間および持続性

- ▶ アスリートで5日間、一般的には10日間前後を要する。
- ▶ 暑熱順化した後は、5日に1度、暑熱環境で運動を行うことで持続できる。

3 トレーニングの強度、時間、服装など

- ▶ 20～40%の強度から始め、5～10日間をかけて、徐々に強度を高くしていく。
- ▶ 運動時間は、30分前後から始め、5～10日間をかけて、徐々に長くしていく。

4 その他

- ▶ 順化により発汗量は増加するため、より多くの水分を補給することが必要である。

Peariard et al., 2015; Casa ed., 2018; NSCA's essentials of sport science, 2022

失われる水と塩分を取り戻そう

》》 運動と汗 《《

汗の意義

汗が蒸発するときに皮膚表面から気化熱を奪って体温を下げます。100gの汗をかくと、それがすべて皮膚から蒸発したとして（1gの汗の蒸発は0.58kcalの熱を奪う）、体重70kgの人では体温を約1℃下げることができます。ただし、蒸発せずに体表表面からポタポタとしたたり落ちてしまった汗は、本来の目的を達成できない無駄な汗となります。

発汗のしくみ

汗は汗腺から分泌されますが、汗腺には腋の下などに局在するアポクリン腺と全身の皮膚表面に開口するエクリン腺とがあり、体温調節にあずかるのは水分を多く分泌するエクリン腺（以下、汗腺）の方です。汗腺は視床下部の体温調節中枢に支配されています。皮膚や脳からの温度情報を体温調節中枢が受け取り、中枢が暑いと判断すると、汗を出す命令が発汗神経を介して汗腺へ伝達され、汗腺から汗が分泌されます。汗腺には汗を分泌できない不能汗腺と分泌能力のある能動汗腺とがありますが、日本人の能動汗腺数は約230万と言われ、この汗腺の能動化は2歳半で成人の値になります。

汗腺では、血液や間質液を原料として汗の原液が作られます。汗の成分の99%以上は水ですが、細胞や血液と同じように塩分などの電解質も含まれています。汗の量が少ない場合、汗原液中の塩分は皮膚表面に分泌されるまでに再吸収されますが、汗が多くなると再吸収されない塩分が増え、汗の塩分濃度が上昇します。汗を多くかいた時に電解質を含んだ飲料が勧められるのはこのためです。

スポーツ活動中の汗の量

私たちはスポーツ活動中にどの程度の汗をかいているのでしょうか。夏の甲子園大会を目指して練習に励む球児たちが、どれくらいの環境下でスポーツ活動を行い、どれくらいの汗をかいているかを実態調査した結果をみてみます。

図22の左図は、北海道から九州まで全国5地域において行われた夏期練習時の環境温度をWBGTで示し、右図は発汗量および脱水量の体重に対する割合で示したものです。発汗量(率)は地域によって異なっており、体重の2～7%と幅がありますが、やはりそのときの環境温度が大きく影響しているようです。「熱中症予防運動指針」(15ページ)の「運動は原則中止」に相当するWBGT31℃前後にある東北・山形、関西・大阪の発汗率が6～7%と大きくなっています。ただし、この調査では球児たちが自由に給水できる環境が整えられ、その結果、水分補給が十分行われ脱水率は1～2%に収まっていました。それでもWBGTが31℃前後になっている地域では、発汗量が大きく脱水率も2%に達していることから、熱中症予防に相当の注意を払う必要があります。






図22 全国の高校野球夏期練習時の環境温度と発汗率および脱水率
 発汗率=体重に対する発汗量の割合
 脱水率=体重に対する脱水量(体重減少量)の割合

▶ 運動と水分、塩分の補給

運動中の発汗量は、1時間に2リットルにも及ぶことがあります。このような多量の発汗によって脱水が体重の2%以上になると、運動能力や競技成績への影響が大きくなります(図23)。したがって、運動中に汗によって失われた水分は適切に補給してやる必要があります。




図 23 カラダの水分が減ることによる運動能力の低下 (Bangsbo, 1992)

一方、脱水とは逆に水を取り過ぎることの弊害もあります(43ページの「低ナトリウム血症」を参照)。2%以上の脱水は避けなければなりません、同時に体重減少量以上に過剰な水を取り過ぎてしまうことにも注意が必要です。

水分補給には、体から失われる水分量、すなわち発汗量に相当する量を補えばよいのですが、汗の量は個人の身体サイズ、そのときの気象条件、運動強度によって大きく異なり、一律には決まりません。重要なことは、脱水レベルの2%以内に抑えつつ、飲み過ぎには注意することです。「のどの渇き」に応じた自由な飲水でも、1時間前後の短時間の運動時では2%以内の脱水に抑えられます。一方で、長時間の運動や強度の高い運動時には、「のどの渇き」に頼らない計画的な水分補給が必要になります。体重50kgの人であれば、練習後の体重減少量が1kg以内に収まればよいことになります。

》》》 運動時の水分補給のしかた 《《《

運動中、過度の脱水にならないように発汗量に見合った水分を補う必要があり、同時に飲み過ぎにも注意しなければなりません。適切な水分の補給量は、体重減少が体重の2%以内に収まることが目安になります。運動の強度が高い場合で、気温が高く、体の大きい人では多めの量を、気温が低く、体の小さい人では少なめの量を選択する配慮が必要です。適切な水分補給を心掛けてください。

自由で水分補給できる環境を

運動中、自由に水分を補給できる環境を整えることが大切です。スポーツドリンクなど水分・塩分を補給できる飲料を用意し、適宜飲水休憩をとるなどの工夫をします。補給量については、「のどの渇き」に応じて、また運動形態によっては計画的に補給することで、体重減少量(脱水量)は2%以内に収まります。


体重測定で汗の量を知る

体重減少量は個人によって著しく異なります。運動前後の体重を測ることでそのときの発汗量を知ることができ、水分補給の必要量を予測することができます。日頃から、運動前後の体重を測る習慣を身につけるとよいでしょう。

▶ 1時間あたりの発汗量の計算

1時間あたりの発汗量

$$\frac{\text{運動前の体重} - \text{運動後の体重} + \text{飲水量}}{\text{運動時間(時間)}}$$



暑熱環境下での運動時は、

- ① 15～20分ごとに
- ② 150～250mlの量の
- ③ 飲みやすい温度の
- ④ 電解質と糖質を含んだ

飲料を補給することが勧められます。

補給する飲料の中身としては、0.1～0.2%の食塩と糖質を含んだものが効果的で、一般のスポーツドリンクが利用できます。ただし、余り糖質濃度が高くなると胃にたまりやすく好ましくありません。エネルギーの補給を考慮すれば、4～8%程度の糖質濃度がよいでしょう。

[食塩相当量が0.1～0.2g(100ml中)であれば、0.1～0.2%の食塩水に相当します。]

Casa et al. ACSM,2007; NATA, 2017; Periard et al., 2021





子どもの水分補給

汗をかいて体から多くの水分が失われると、自然にのどの渇きをおぼえます。こののどの渇きは、飲水行動をうながし、体内の水分を安定した状態に保つ役割を演じています。とりわけ、スポーツ活動時のように短時間に大量の水分が失われるような場合に重要になります。

夏のスポーツ活動中にスポーツ飲料を自由に補給させた場合、大人は発汗量の60～70%を補給しますが、子どもでも発汗量に見合った水分を補給することができます。図24は、スポーツ少年団を対象に夏の練習時にどれくらい水分を補給しているかを調査した結果です。このとき、練習中に水分を自由に補給できるように飲料を準備し、適宜飲水休憩をとらせています。バレー、バスケット、サッカーなどのように比較的運動量の大きな種目では、2時間半程度の練習で1リットル以上の汗をかきますが、子どもたちはそれに見合った水分補給をして、体重減少量は体重の1%以内に収まっています。

子どもの口渇感が特に大人に劣るということはないようです。安全なスポーツ活動のためには、のどの渇きに応じて自由飲水ができるように指導し、その能力を磨くべきでしょう。

夏期のスポーツ活動時には、状況に応じて水分補給タイムを設けるなどの工夫をしながら、子どもたちが自由に飲料を利用できる環境を整えることが何より大切です。




図24 スポーツ少年団の夏期練習中における水分摂取の実態調査
(川原ほか,2002)



低ナトリウム血症・水中毒

2002年、アメリカのマラソンレースで低ナトリウム血症による死亡事故が続けて起こりました。いずれも女性の初心者ランナーで、水の飲み過ぎが原因と診断されています。死亡事故の報道でにわか注目されるようになりましたが、ごくまれにしか起こらない事故とは限りません。細胞中の水が過剰になることで起こり、軽症では無症状のこともあります。倦怠感、吐き気、嘔吐、筋肉のこむら返りなどの症状がみられ、重症になると肺水腫（肺に水がたまった状態）や脳浮腫（脳がむくんだ状態）から呼吸困難や意識障害などの症状が起こり、最悪の場合にはこの事故例のように死に至ることもあります。

運動中に起こる低ナトリウム血症の原因はまだよくわかっていませんが、はっきりしているのは、事故を起こしたランナーがいずれも水を飲み過ぎてレース後に体重が増加していることです。走る速度が遅く、レース時間が長くなるほど、また発汗量の少ない冬のレースほど、そして体重の軽い人（女性）ほど水が過剰になりやすく低ナトリウム血症の危険性が高くなります。したがって、一流ランナーより市民ランナーに注意が必要です。

長時間運動時には脱水防止のため適切な水分摂取は欠かせません。その一方で、決められた量の水を無理に飲み続けることも是非避けなければなりません。のどの渇きに応じて、適宜水分を補給することで過剰な摂取にもならず、また過度の脱水を防ぐことができます。そのほか、水分補給のしかたは40・41ページを参照してください。



冷やそう、からだの外から内から

>>> 身体冷却 <<<

体温・筋温の最適レベル

運動時の適度な体温上昇は代謝速度、神経伝達、筋の柔軟性などを高め、運動パフォーマンスの向上に貢献しています。一般的に温度が低い場合は、ウォーミングアップによって体温を上昇させていますが、環境温度が高温となりより長時間の運動になると体温は過度に上昇し、運動効率の低下や熱中症を引き起こしてしまいます。つまり、体温や筋温には、生体反応やパフォーマンスを向上させる最適な温度域があります。




図 25 体温・筋温の至適(最適)温度域
(長谷川、中村. スポーツ現場における暑さ対策, 2021より)

▶ 身体冷却の効果

スポーツの成績は体温上昇に強く影響されるため、暑い環境下でも体温の過度な上昇を抑えることで熱中症の予防、持久性運動能力や認知機能の低下の抑制、多量の発汗による脱水予防などができます。身体を冷却することで、深部体温や皮膚温だけでなく心拍数などの心臓循環系の指標や、暑さ、運動のきつさ、疲労、快適性などの主観的感覚が改善し、暑熱下における運動パフォーマンスの低下を防ぐことができます。したがって、暑熱下のスポーツ活動時では、積極的に身体冷却を実施することが重要です。





図 26 暑い環境下での運動パフォーマンスの低下
(Flouris & Schlader, 2015 を改変)

実際に身体冷却を実施するには、①冷却方法、②タイミング、③冷却時間を考慮して行うとよいでしょう。これら3つの変数の組み合わせによって、得られる効果が異なります。

冷却方法 × タイミング × 冷却時間

▶ 身体冷却の方法

冷却方法は大きく2つに分けることができます。バスタブなどを用いた冷水浴(アイスバス)やアイスパック、クーリングベスト、送風などを用いて皮膚などの身体の外部から冷却する「身体外部冷却」と、冷たい飲料などを摂取し、身体の内部から冷却する「身体内部冷却」とがあります。実際のスポーツ現場では両方を組み合わせて行うとよいでしょう。これらの身体冷却によって、体温や発汗、代謝機能、暑さや疲労などの主観的感覚、筋の損傷や炎症反応に良い影響を及ぼします。



- 体温(深部体温、皮膚温)、筋温、発汗、代謝
- 主観的感覚(痛み、温熱感覚、疲労)、モチベーション
- 筋損傷、炎症性反応 など

図 27 身体冷却の方法とその効果

(長谷川、中村. スポーツ現場における暑さ対策, 2021より)

外部冷却の効果

外部冷却は、伝導や対流による非蒸発性熱放散と発汗による蒸発性の熱放散の仕組みを利用して身体を冷却するものです(21ページ参照)。最近注目されている外部冷却に、手掌(手のひら)・前腕冷却があります。手、足、耳など身体のうちで最も露出した部分では、動脈と静脈を結ぶバイパスのような特殊な血管である動静脈吻合(AVA)血管があります。このAVA血管は直径が大きく、開大すると多量の血液が流れます。冷たすぎず血管が収縮しない温度(15℃前後)で手のひら・前腕冷却を行うと、冷やされた血液が身体の中心部に戻り、冷えた血液が全身を循環するため身体が冷却されます。比較的短い時間でも大きな冷涼感を得ることができます。

図28は暑い環境下の実験室で、激しい強度の運動と運動の間の休憩中に、手のひらと前腕を冷水(約15℃)で冷やした時の直腸温(深部体温)の変化です。手のひらと前腕を冷却すると、冷却しない条件に比べ体温が大きく低下しました。その結果、体温が低い状態で2回目の運動を行うことができ、体温のほか心拍数、暑さや疲労などの感覚も改善されたため運動パフォーマンスが向上しました。





図28 暑熱環境下における身体冷却が運動時の体温上昇に及ぼす影響 (Iwahashi, Hasegawa et al. Frontier in Physiology, 2023より)



(Hirata,1990から改変作図)

内部冷却の効果

内部冷却は、皮膚や筋肉の温度を大きく低下させることなく、身体の内部(核心部)を冷却できることが特徴です。最近では氷と飲料水が混合したシャーベット状の飲料物であるアイススラリーの摂取が注目されています。これは細かい氷の粒が液体に混ざったもので、通常の氷に比べ結晶が小さく、氷が水に変わる際に外部から熱を吸収するため、飲料水と比べアイススラリーの持つ冷却効果は高いことが特徴です。図29のように、運動前の安静時のアイススラリーの摂取により直腸温が低下し、暑熱下の運動継続時間が延長しました。アイススラリーを用いたプレクーリングは、冷水浴を用いた時と比較しても同等の持久性および間欠性運動パフォーマンスの向上をもたらすことや、摂取によって冷却された血液が脳にも影響を及ぼすため、脳の活性化や運動継続のためのモチベーションを改善する可能性もあります。また、スポーツ飲料でアイススラリーを作ると、身体冷却に加え、水分、電解質、糖質も同時に補給できるので効果的な方法といえます。ただしアイススラリーや冷たい




図29 アイススラリーの摂取が暑熱下での体温と持久性運動能力に及ぼす影響 (Siegel et al. Med Sci Sports Exerc. 2010を改変 長谷川, もっとなっとく使えるスポーツサイエンス, 2017)



飲料は多くの量を飲むことが難しいため、外部冷却と組み合わせることで摂取量を減らすことができます。

▶ 身体冷却はタイミングも大事

冷却のタイミングは、運動前(プレクーリング)、運動中、ハーフタイムなどの休憩時、運動後のリカバリーに大別できます。プレクーリングはあらかじめ運動前に体温を低下させておいて、運動中の体温の許容量(貯熱量)を大きくでき、運動時間を延ばそうとするものです。運動中や休憩時の冷却は、体温や筋温の過度な上昇を防ぎ、疲労感や暑さなどの主観的な感覚を和らげます。また運動後の冷却は、上昇した体温や筋温による疲労の軽減、筋損傷や炎症反応を抑えることができます。いつまでも体温上昇が続くと余分なエネルギーを消費してしまうため、運動後に身体を冷却することで、リカバリー効率の向上につながります。




図 30 暑熱環境下の競技現場における身体冷却のタイミング、目的、種類

(長谷川、中村: スポーツ現場における暑さ対策、2021)

▶ 身体冷却をスポーツ現場に取り入れる

表にスポーツ活動時における実践的な身体冷却方法とその特徴をまとめました。それぞれの冷却方法の目的や冷却効率を理解したうえで実施することが重要です。また、身体冷却は競技特性を考慮して実施すべきであり、スポーツ現場ではそれらの実用性や簡便性が重要になってきます。実際の暑熱環境下のスポーツ活動時では、イラストのように身体内部(アイススラリーの摂取)と外部からの冷却(クーリングベストの着用、手掌冷却)を組み合わせ、深部体温をコントロールし、高い運動パフォーマンスを発揮できるよう工夫するとよいでしょう。実践的な暑さ対策は、夏季におけるトレーニング効率を向上させるため、熱中症予防や運動パフォーマンスの向上につながります。暑熱下のスポーツ活動時に、積極的に身体冷却を取り入れ、熱中症を予防しましょう。



冷却方法		冷却効率		実用性				簡便性	運動能力	備考
		核心	皮膚	運動前	運動中	休憩時	運動後			
外部冷却	アイスバス	◎	◎	○	—	△	◎	△	○	冷却直後のスプリント運動や筋発揮に負の影響あり
	アイスパック	△	◎	△	△	◎	◎	◎	△	冷却効率はアイスバスの1/10程度
	クーリングベスト	△	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	運動中着用できるが、重量が気になる場合がある
	送風	△	○	△	—	◎	○	○	△	霧吹き/水噴射との組み合わせ可能、屋外でも使用可能
	頭部・頸部冷却	△	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	運動中使用できるが、核心までは冷えないので熱中症に注意
	手掌冷却	◎	○	◎	—	◎	○	◎	◎	温熱感覚に好影響、様々なスポーツ競技で実施可能
内部冷却	水分補給	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	○	脱水予防やエネルギー補給が可能
	アイススラリー	◎	△	◎	△	◎	◎	◎	◎	電解質/糖質補給と冷却効果を組み合わせることができる

表 身体冷却方法とその特徴



衣服と体温



環境温度の変化や、運動によって熱産生量が増えると、身につけている衣服を脱いだり、新たに着用したりして体温の調節をします。

皮膚表面と衣服との間にできる局所の気候を衣服気候(または微気候)とよび、体温調節反応や快適感はこの衣服気候によって影響されます。衣服気候は衣服の大きさ、型、材料などによって調節が可能で、衣替えは衣服による行動性体温調節のひとつと言えます。さらに、衣服気候は運動や環境条件にも影響されます。他方、衣服気候は皮膚温、発汗、皮膚血流、皮膚の湿潤度、蒸発の程度などに影響します。

▶ 体からの熱放散促進

高温下での運動時には、体温上昇とともに、体表温度も上昇し、衣服気候も変化します。衣服気候を快適な状態に保つためには、衣服素材の通気性や水分放散性が高く、保温性が低い熱放散に優れた衣服が勧められます。水分放散性に関しては、汗の量が少ないときには吸湿性が高い綿などの天然繊維や合成繊維で処理できますが、大量の発汗の場合には放湿性に優れた吸水速乾性の高い合成繊維の方が汗の処理に適しています。

一般に衣服の熱抵抗は衣服で覆われる面積に比例して大きくなるため、なるべく体表を覆う面積の小さい薄着の方が熱は放散しやすくなります。また、四肢は体幹部よりも熱放散効率が高いため、できるだけ四肢を露出したほうが効果的です。

夏期スポーツ活動では、半そで、短パンなどの軽装薄着が適しています。しかしスポーツ種目によっては、外傷予防をはじめさまざまな理由からその種目特有のユニフォームを着用することになります。特に、剣道やアメリカンフットボールなどのような防具(ギア)を着用するスポーツ種目では、熱の放散量が制限されるため、十分注意が必要です。このようなスポーツ種目では、環境条件やトレーニングの過程などを考慮に入れて着衣条件を変えていくことが大切です。

アメリカンフットボールの例では、全米大学体育協会(NCAA)は夏期トレーニング開始時に5日間の暑熱順化期間を設け、この順化期間でのフル・ユニフォームの装着を禁じ、ヘルメット、ショルダーパッド、そしてフル・ユニフォームと順次着衣条件を変えるように規定化しています。

図31は、剣道着・防具を着用した条件と着用しない条件における高温下運動時の直腸温、心拍数、発汗量を示したものです。明らかに、剣道着・防具着用時には熱放散が制限され、循環および体温調節系への負荷が増していることがわかります。したがって、こうした重装備の服装やユニフォームを着用しなければならないスポーツ種目では、できるだけ休憩時間を設け、その間に防具をはずし衣服を緩め、冷たいタオルや氷嚢などで体を冷やし体温を下げる工夫が必要です。






図 31 剣道着・防具着用時の生体負荷
(丹羽,2002)

体調不良は事故のもと

≫≫ 体調と熱中症 ≪≪

暑さへの耐性は個人によって大きな差があります。体力の低い人、肥満の人、暑さに慣れていない人、熱中症を起こしたことのある人などは暑さに弱いので運動を軽減する必要があります。筋で発生した熱は血液によって皮膚に運ばれ放散されるので、熱の放散能力には循環機能が関係します。持久力の低い人は循環機能も低いので暑さに弱いのです。肥満の人は同じ運動でもエネルギー消費が大きく、熱の発生も多くなります。また、皮下脂肪が熱の放散を妨げるため、うつ熱が起きやすくなります。暑さへの慣れも重要です。急に暑くなったとき、涼しいところから暑いところへ移動したとき、しばらく休んでいて暑いときに復帰した場合などは注意が必要です。

同一個人でも暑さへの耐性は体調によっても変わってきます。体調が悪いと体温調節能力が低下します。熱中症の事故にはしばしば体調が関係しています。疲労、睡眠不足、発熱、風邪など体調が悪い場合には無理に運動をしないようにしましょう。また、胃腸障害で食欲が低下したり、下痢があると脱水傾向となり、熱中症になりやすいので注意が必要です。





体調チェック

万全の体調でトレーニングにのぞむことが、熱中症予防はもとより、より効果的なトレーニングを進めるためにも重要になります。ここでは、熱中症予防の観点から、指導者が選手の体調を管理するうえで必要になるチェックポイントを紹介します。

選手の特性チェック



指導者は選手の特性をあらかじめ把握しておきます。

1つでもチェックが入れば、その選手の日頃のトレーニングに目を配ります。

- 暑さに慣れていない
- 過去に熱中症を経験したことがある
- 肥満気味である
- 体力が低い

環境チェック

以下の環境チェックに応じて、トレーニングメニューを考慮し、選手指導の参考にします。

● WBGTの確認

- 運動中止
- 厳重警戒
- 警戒
- 注意
- ほぼ安全

● 天候の特徴

- 急に暑くなった
- 特に蒸し暑い

トレーニング前の体調チェック

選手には、練習日誌などを用い、

練習の前に自分の体調をチェックする習慣をつけさせます。

1つでもチェックが入れば、その選手のトレーニングメニューを軽くして、常にその選手に目を配るようにします。

- 睡眠が不足している(よく眠れなかった)
- 熱がある、熱っぽい
- 喉が痛い
- 風邪を引いている
- 下痢をしている
- 朝食を抜いた

▶ 熱中症からのスポーツへの復帰

一度、熱射病を起こした人は、医師の許可があるまでは運動を控えてください。運動を再開する場合には、涼しい環境で軽い運動から徐々に始めます。暑熱下の運動は、体力が十分に回復した後に、暑さに十分慣らしてから行うようにしましょう。少なくとも退院後7日は運動を控えてください。その後、涼しい環境での運動から始め、2週間くらいかけて暑さに身体を慣らし、さらに2～4週間のトレーニングを経て、競技への完全復帰を行きましょう。

熱疲労の場合も、当日の復帰は見合わせ、慎重に進めるべきです。軽症の場合でも、1～2日様子を見てから再開しますが、その場合にも運動の強度と量は徐々に上げるようにしましょう。



市民マラソンのための運動指針

マラソンは熱負荷の大きい運動であり、一般のスポーツ活動より熱中症の発生する危険性が高くなります。したがって、一般のスポーツ活動とは異なる基準にする必要があります。ここでは、市民マラソンを対象とした運動指針として、アメリカスポーツ医学会などの指針を参考にして示しました。

なお、マラソンレースでは多量の汗をかき体から水分が失われます。そのため、適切に水分補給をする必要があります。ただし、水の飲み過ぎは、胃の具合が悪くなるだけでなく、思わぬ事故(低ナトリウム血症)を起こすこともあり、注意が必要です。また、暑さによる障害だけでなくWBGT10℃以下の低温では低体温症の危険があります。

この表では、熱中症の危険度とフラッグカラーを示しました。開催時のWBGTにより危険度を示す色の旗を提示することで、参加者、関係者に注意喚起を促すことができます。

WBGT ℃	熱中症の危険度	フラッグカラー	警告
28	極めて高い	黒	熱中症の危険性が極めて高い。出場取消。
23	高い	赤	熱中症の危険性が高く、嚴重注意。 トレーニング不足の場合は出場取消。
18	中等度	黄	レース途中で気温や湿度が上昇すると危険性が増すので、注意。 熱中症の兆候に注意し、必要ならばペースダウンする。
10	低い	緑	熱中症の危険性は低い。 ただし熱中症が起こる可能性もあり注意が必要。
	低い	白	低体温症の危険性がある。 雨天、風の強い日には特に注意が必要。

(ACSM 1987, Hughson RL et al. 1983)

プールにおける熱中症の予防

2014年に中学校水泳部における熱中症発症が報道されたことから、プールでも熱中症が発生することが認識されました。日本スポーツ振興センターの資料によると、プールでの熱中症の発生は、2013～2017年の5年間で179件ありましたが、死亡事例はありませんでした。2017年度の28件のうち8件は見学中に発生していました。プールサイドに直射日光が当たらないよう日除け、テント、遮光ネットを設置することがのぞまれます。

水中での人の体温には、水温が大きく影響します。水中で安静状態の人の体温が上がっても下がりにくい水温を「中性水温」といい、33～34℃です。水中で運動する場合には、これ以下の水温であっても、その運動強度に応じて体温が上昇します。夏季の屋外プールや温水プールでの水泳時には体温が上昇し、かなりの汗をかき、脱水を生じています。発汗量に応じた水分補給が必要です。また、水泳時には口の中が水で濡れるため、のどの渇きを感じにくいことに注意が必要です。




図 32 高校水泳部の練習時のプールの水温と発汗量、飲水量、脱水量の関係
(環境省「熱中症 環境保健マニュアル2018」より)

※タテ軸は1時間に体重1kg当たりの量

プールから出ると全身が濡れており、皮膚の上で水が蒸発することで、全身に汗をかいたときと同じ体温を下げる効果があり、水泳運動を行い体温が上昇しても、プール外の風通しのよい日陰で休憩することで、体温は比較的容易に低下すると推測されます。熱中症の予防のためには、長時間の連続泳を避け、こまめに日陰や冷所で休憩をとりましょう。

▶ (公財)日本サッカー協会(JFA)のWBGTに基づいた熱中症対策 ◀

JFAでは2002年から、育成年代の試合において、中学生、高校生はWBGT28℃以上(小学生は25℃以上)で、試合中の意図的な水分補給時間(飲水タイム)を導入してきました。飲水タイムが導入された当時は、指導者から「飲水タイムによってゲームの流れが変わってしまった」など導入に否定的な声もありました。現在では、飲水タイムの認識は定着し、育成年代だけではなく全ての年代の試合において、WBGTに基づいて飲水タイムだけではなく、身体の冷却を目的としたクーリングブレイク(Cooling break)も設定されるようになりました。以下が、2016年に通達されたJFA熱中症ガイドラインの主な内容になります。図33に示されているように、試合中のWBGTによって、下記のJFA熱中症対策AとBを講じなければ、試合は開催できないことを強く勧告する内容になっており、他競技にも参考になる具体的な対策になっています。

https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline_amendment.pdf (JFAにおける熱中症対策)

JFA熱中症対策A の主な内容

- 日射を遮る
- スポーツドリンクが飲める環境を整える
- 緊急対応用の氷、スポーツドリンク、経口補水液、救急病院を準備する
- Cooling breakまたは飲水タイムを行う

JFA熱中症対策B の主な内容

- 会場に医師、看護師、一次救命処置保持者のいずれかを常駐させる
- クーラーがあるロッカールーム、医務室が設備された施設で試合を行う




図33 WBGT過去平均値による試合時間の規制と対策

(公財)日本サッカー協会ホームページ、https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline.pdf、https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_faq.pdf、2016より)

屋根付き運動スペース設置の提案

日本では、近年ますます、夏の暑さが厳しくなっています。殊に、強い直射日光のあたる屋外では、太陽の輻射熱により、WBGTが高くなります。

屋根付きのテニスコート（側壁は可動式で、半開放状態にて測定）のWBGTを8月に実測し、屋根による日射遮蔽効果がWBGTに及ぼす影響を検証しました。図に示すように、屋根によるWBGTの低減効果は、日射の強い（日中）ほど大きく、最大で4～5℃（WBGT）に及びました。屋外コートではWBGT31℃以上（原則運動中止）の時間帯が1日に4～6時間ありましたが、屋根付きコートでは全くありませんでした。屋根付き運動施設の暑さ対策としての有効性を示すものです。




図 34 屋外テニスコートと屋根付きテニスコートにおけるWBGT(2019年8月17日、18日)

(加治木政伸、他、日本気象学会誌 57:17-23, 2020より)

(注)夕方17時頃のWBGTの上昇はコート後方に設置したWBGT計に西日が当たった(コート内には日差しなし)ためのアーチファクト。

運動時の休憩の取り方

夏場にスポーツ活動を行う場合は、くれぐれも無理のないよう、①運動強度を調節する、②適宜休憩をとる、③適切な水分・塩分補給を行う、④積極的にからだを冷やす(身体冷却)ことが重要です。

特に、休憩に関しては、熱中症予防運動指針でも説明しているように、WBGT25℃以上では、熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり、適宜、水分・塩分の補給を行うとよいでしょう。激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとることが重要です。


運動の合間の休憩

身体運動を行うと体内で作られる熱(熱産生)が増加するため体温が上昇します。激しい運動では熱産生量が多くなるため、軽い負荷の運動に比べ体温の上昇が大きくなります(P22を参照)。さらに、暑い環境で運動を行うと体温の上昇は大きくなり、熱中症になる危険性が高まります。しかし運動を中止し、しばらく休憩することで熱産生量は減少するため、体温は下がります。



図は暑い環境下(室温35℃、湿度50%)の実験室で、中強度(最大努力の50%)の運動負荷で約30分の自転車運動およびその後の休憩時の直腸温(深部体温)の変動を示したものです。暑熱下の中強度運動により直腸温が38.5℃まで上昇し、その後15分の休憩で体温の上昇が緩やかになり、運動をやめたときの体温に戻りました(冷却なし条件)。30分の休憩により体温は約0.2℃の低下、45分の休憩で体温は約0.5℃低下し、体温は38℃まで回復しました。運動後の休憩の際、15分間、手のひらまたは足の裏を冷水(15℃)で冷却すると、冷却しない条件に比べ体温が低下し、上昇した体温を早く回復させることができました(身体冷却でも説明しているように、休憩中に手のひら・前腕部を冷水で冷却すると、体温が低下し、休憩後、楽に運動することができます[P47を参照])。このように暑い環境での運動では、適宜、休憩をとり、身体を冷やすことでスポーツによる熱中症事故を防ぐことができます。

また、屋外における運動では日陰かテントの下など、直射日光を避け休憩することで暑さを避けることができます。



n=10. *P<0.05 手のひら冷却vs冷却なし. #P<0.05 手のひら冷却vs足の裏冷却

図 35 暑熱環境下における運動後の休憩または身体冷却が体温変動に及ぼす影響
(長谷川,未発表データ)

参考文献

- American College of Sports Medicine. The prevention of thermal injuries during distance running. *Med Sci Sports Exerc.* 19(5): 529-533, 1987.
- Armstrong LE, et al. American College of Sports Medicine position stand. Heat and cold illnesses during distance running. *Med Sci Sports Exerc.* 28: i-x, 1996.
- Casa D. J. *Sport and Physical Activity in the Heat.* Springer International Publishing, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-70217-9>, 2018.
- Casa DJ, et al. National Athletic Trainers' Association Position Statement: Exertional Heat Illnesses. *J Athl Train.* 50: 986-1000, 2015.
- French D. N., & Ronda, L. T. (Eds.). *NSCA's Essentials of Sport Science.* Human Kinetics Publishers, 2022.
- 長谷川博：身体冷却， スポーツ現場における暑さ対策—スポーツの安全とパフォーマンス向上のために—(長谷川博, 中村大輔 編著), ナップ, pp90-103, 2021.
- 長谷川博：運動と環境, ステップアップ運動生理学(和田正信編), 杏林書院, pp119, 2018.
- 平田耕造：AVA血流量と熱放散システム, 体温—運動時の体温調節システムとそれを修飾する要因—(平田耕造, 井上芳光, 近藤徳彦 編著), ナップ, pp89-96, 2002.
- Hughson RL, Staudt LA, Mackie JM. Monitoring road racing in the heat. *Phys Sportsmed.* 11(5): 94-105, 1983.
- 井上芳光：発育と老化, 体温II(井上芳光, 近藤徳彦編), ナップ, pp220-237, 2010.
- Iwahashi M, Chaen Y, Yanaoka T, Kurokawa Y, Hasegawa H. Cold water immersion of the hand and forearm during half-time improves intermittent exercise performance in the heat. *Front Physiol.* 14: 1143447, 2023.

-
- 川原貴ほか：ジュニア期の夏期スポーツ活動に関する研究—第1～2報—, 日本体育協会スポーツ科学研究報告. 2001～2002.
 - 厚生労働省：人口動態統計(確定数, 死亡, 年次), 人口動態調査, 2025.
 - 中井誠一：我が国における熱中症の死亡統計—どのような統計分類を使用すべきか?—, 日生氣誌, 56(2): 67-75, 2019.
 - Namineni N, et al. Marathon Runners' Knowledge and Strategies for Hydration. *Clin J Sport Med.* 32(5): 517-522, 2022.
 - Périard J. D., Racinais S., & Sawka M. N. Adaptations and mechanisms of human heat acclimation: applications for competitive athletes and sports. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, 25, 20-38, 2015.
 - Roberts WO. Heat and cold: what does the environment do to marathon injury? *Sports Med.* 37: 400-3, 2007.
 - Sawka MN, et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. *Med Sci Sports Exerc.* 39: 377-90, 2007.
 - Scheer V. & Knechtle B. Exercise associated hyponatremia in endurance sports: a review with practical recommendations. *Arch Med Deporte.* 37(4): 260-265, 2020.
 - Siegel R, Maté J, Brearley MB, Watson G, Nosaka K, Laursen PB. Ice slurry ingestion increases core temperature capacity and running time in the heat. *Med Sci Sports Exerc.* 42(4): 717-725, 2010.
-

著者紹介

川原 貴

Takashi Kawahara

一般社団法人大学スポーツ協会 副会長

専門: スポーツ医学、内科、循環器

伊藤 静夫

Shizuo Ito

一般財団法人東京マラソン財団 顧問

専門: 運動生理学、トレーニング科学

杉田 正明

Masaaki Sugita

日本体育大学体育学部 教授

専門: 運動生理学、トレーニング科学

田中 英登

Hideto Tanaka

松山大学 特任教授

専門: 環境生理学、運動生理学

長谷川 博

Hiroshi Hasegawa

広島大学大学院人間社会科学研究科 教授

専門: 運動生理学、環境生理学、神経科学

松本 孝朗

Takaaki Matsumoto

中京大学スポーツ科学部 教授

専門: 環境生理学、運動生理学、スポーツ医学、内科学

安松 幹展

Mikinobu Yasumatsu

立教大学スポーツウエルネス学部 教授

専門: 環境生理学、運動生理学、スポーツ科学

青野 博

Hiroshi Aono

公益財団法人日本スポーツ協会スポーツ科学研究室 室長

専門: 運動生理学

発行日: 平成 6年6月10日(第1版)
平成10年6月25日(第2版)
平成18年6月30日(第3版)
平成25年4月16日(第4版)
令和 元年5月20日(第5版)
令和 7年6月28日(第6版)

発行: 公益財団法人日本スポーツ協会

協賛: 大塚製薬株式会社

制作: 株式会社エヌ・ピー・ディー

問い合わせ: 公益財団法人日本スポーツ協会スポーツ科学研究室

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE
Tel 03-6910-5806

熱中症予防運動指針

WBGT ℃	湿球温度 ℃	乾球温度 ℃		
31	27	35	運動は原則中止	特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合には中止すべき。
▲▼	▲▼	▲▼	嚴重警戒 (激しい運動は中止)	熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。10~20分おきに休憩をとり水分・塩分を補給する。暑さに弱い人※は運動を軽減または中止。
28	24	31	警戒 (積極的に休憩)	熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。
▲▼	▲▼	▲▼	注意 (積極的に水分補給)	熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。
25	21	28	ほぼ安全 (適宜水分補給)	通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。
▲▼	▲▼	▲▼		
21	18	24		

- 1) 環境条件の評価にはWBGT(暑さ指数とも言われる)の使用が望ましい。
 - 2) 乾球温度(気温)を用いる場合には、湿度に注意する。
湿度が高ければ、1ランク厳しい環境条件の運動指針を適用する。
 - 3) 熱中症の発症のリスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。
運動指針は平均的な目安であり、スポーツ現場では個人差や競技特性に配慮する。
- ※暑さに弱い人: 体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など。

知って防ごう熱中症

フェアプレーで
日本を元気に

あくしゅ、あいさつ、ありがとう



Otsuka 大塚製薬

大塚製薬は、日本スポーツ協会が行っているスポーツ活動中の熱中症予防活動を応援しています。